

化学療法レジメン	ページ番号
CDDP+RT	2
TP	3
TC(子宮頸がん)	4
TC+ベバシズマブ+ペムブロリズマブ(1~6クール目)	5
TC+ベバシズマブ+ペムブロリズマブ(7クール目以降)	6
AP	7
DC(子宮体がん)	8
DTX(子宮体がん)	9
DP(子宮体がん)	10
TC(子宮体がん)	11
TC+ペムブロリズマブ(1~6クール目)	12
TC+ペムブロリズマブ(7クール目以降)	13
TC+デュルバルマブ+オラパリブ(1~6クール目)	14
TC+デュルバルマブ+オラパリブ(7クール目以降)	15
ペムブロリズマブ+レンバチニブ	16
BEP	17
CBDCA	18
CPT-11	19
DC(卵巣がん)	20
DC+ベバシズマブ(術後1クール目)	21
DC+ベバシズマブ(1~6クール目(術後2~6クール目))	22
DC+ベバシズマブ(7クール目以降)	23
DTX(卵巣がん)	24
dose-denseTC	25
DP(卵巣がん)	26
GC	27
GC+ベバシズマブ(1~6クール目)	28
GC+ベバシズマブ(7クール目以降)	29
PLD	30
TC(卵巣がん)	31
TC+ベバシズマブ(1クール目)	32
TC+ベバシズマブ(2~6クール目)	33
TC+ベバシズマブ(7クール目以降)	34
ノギテカン	35
PLD+Bev	36

レジメン名 CDDP+RT

薬品名	投与量	day1	day7
細胞外液 A c e 500mL 【レジメン】	500 mL	○	
パロノセトロン0.75mg 【レジメン】	1 袋	○	
デキサメタゾン3.3mg 【レジメン】	3 A	○	
フロセミド20mg 【レジメン】	1 A	○	
シスプラチニ【レジメン】	40 mg /m <sup>2</sup>	○	
生食注500mL 【レジメン】	500 mL	○	
維持液500mL 【レジメン】	500 mL	○	
休薬完了		休	

レジメン名 TP

薬品名	投与量	day1	day2	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○		
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	2 A	○		
	3 A		○	
ファモチジン20mg【レジメン】	1 A	○		
パクリタキセル【レジメン】	135 mg/m <sup>2</sup>	○		
ブドウ糖液250mL【レジメン】	250 mL	○		
細胞外液A c e 500mL【レジメン】	500 mL		○	
パロノセトロン0.75mg【レジメン】	1 袋		○	
フロセミド20mg【レジメン】	1 A		○	
シスプラチニ【レジメン】	50 mg/m <sup>2</sup>		○	
生食注500mL【レジメン】	500 mL		○	
維持液500mL【レジメン】	500 mL		○	
休薬完了				休

レジメン名 TC(子宮頸がん)

薬品名	投与量	day1	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
パロノセトロン0.75mg【レジメン】	1 袋	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	5 A	○	
ファモチジン20mg【レジメン】	1 A	○	
パクリタキセル【レジメン】	175 mg/m <sup>2</sup>	○	
ブドウ糖液250mL【レジメン】	250 mL	○	
カルボプラチナ【レジメン】	AUC 5	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	
休薬完了			休

レジメン名 TC+ベバシズマブ+ペムブロリズマブ(1~6クール目)

薬品名	投与量	day1	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
パロノセトロン0.75mg【レジメン】	1 袋	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	5 A	○	
ファモチジン20mg【レジメン】	1 A	○	
ペムブロリズマブ【レジメン】	200 mg	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	
パクリタキセル【レジメン】	175 mg /m <sup>2</sup>	○	
ブドウ糖液250mL【レジメン】	250 mL	○	
カルボプラチニ【レジメン】	AUC 5	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	
ベバシズマブ(先発品)【レジメン】	15 mg/kg	○	
休薬完了			休

レジメン名 TC+ベバシズマブ+ペムブロリズマブ(7ケール目以降)

薬品名	投与量	day1	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
ペムブロリズマブ【レジメン】	200 mg	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	
ベバシズマブ(先発品)【レジメン】	15 mg/kg	○	
休薬完了			休

レジメン名 AP

薬品名	投与量	day1	day21
細胞外液 A c e 500mL 【レジメン】	500 mL	○	
パロノセトロン0.75mg 【レジメン】	1 袋	○	
デキサメタゾン3.3mg 【レジメン】	3 A	○	
ドキソルビシン【レジメン】	60 mg /m <sup>2</sup>	○	
生食注50mL 【レジメン】	50 mL	○	
シスプラチニ【レジメン】	50 mg /m <sup>2</sup>	○	
生食注500mL 【レジメン】	500 mL	○	
休薬完了		休	

レジメン名 DC(子宮体がん)

薬品名	投与量	day1	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
パロノセトロン0.75mg【レジメン】	1 袋	○	
デキサメタゾン1.65mg【レジメン】	1 A	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	1 A	○	
ドセタキセル【レジメン】	70 mg/m <sup>2</sup>	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	
カルボプラチナ【レジメン】	AUC 6	○	
休薬完了		休	

レジメン名 DTX(子宮体がん)

薬品名	投与量	day1	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	2 A	○	
ドセタキセル【レジメン】	70 mg/m <sup>2</sup>	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	
休薬完了			休

レジメン名 DP(子宮体がん)

薬品名	投与量	day1	day21
細胞外液 A c e 500mL 【レジメン】	500 mL	○	
パロノセトロン0.75mg 【レジメン】	1 袋	○	
デキサメタゾン3.3mg 【レジメン】	3 A	○	
ドセタキセル【レジメン】	70 mg /m <sup>2</sup>	○	
生食注250mL 【レジメン】	250 mL	○	
フロセミド20mg 【レジメン】	1 A	○	
シスプラチニ【レジメン】	60 mg /m <sup>2</sup>	○	
生食注500mL 【レジメン】	500 mL	○	
維持液500mL 【レジメン】	500 mL	○	
休薬完了			休

レジメン名 TC(子宮体がん)

薬品名	投与量	day1	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
パロノセトロン0.75mg【レジメン】	1 袋	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	5 A	○	
ファモチジン20mg【レジメン】	1 A	○	
パクリタキセル【レジメン】	180 mg/m <sup>2</sup>	○	
ブドウ糖液250mL【レジメン】	250 mL	○	
カルボプラチナ【レジメン】	AUC 6	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	
休薬完了			休

レジメン名 TC+ペムブロリズマブ(1~6クール目)

薬品名	投与量	day1	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
パロノセトロン0.75mg【レジメン】	1 袋	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	5 A	○	
ファモチジン20mg【レジメン】	1 A	○	
ペムブロリズマブ【レジメン】	200 mg	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	
パクリタキセル【レジメン】	175 mg /m <sup>2</sup>	○	
ブドウ糖液250mL【レジメン】	250 mL	○	
カルボプラチニ【レジメン】	AUC 5	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	
休薬完了			休

レジメン名 TC+ペムブロリズマブ(7クール目以降)

薬品名	投与量	day1	day42
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
ペムブロリズマブ【レジメン】	400 mg	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	
休薬完了			休

レジメン名 TC+デュルバルマブ+オラパリブ(1~6クール目)

薬品名	投与量	day1	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
パロノセトロン0.75mg【レジメン】	1 袋	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	5 A	○	
ファモチジン20mg【レジメン】	1 A	○	
デュルバルマブ【レジメン】	1120 mg	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	
パクリタキセル【レジメン】	175 mg/m <sup>2</sup>	○	
ブドウ糖液250mL【レジメン】	250 mL	○	
カルボプラチナ【レジメン】	AUC 6	○	
休薬完了			休

レジメン名 TC+デュルバルマブ+オラパリブ(7クール目以降)

薬品名	投与量	day1	day28
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
デュルバルマブ【レジメン】	1500 mg	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	
休薬完了			休

レジメン名 ペムブロリズマブ+レンバチニブ

薬品名	投与量	day1	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
ペムブロリズマブ【レジメン】	200 mg	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	
休薬完了			休

レジメン名 BEP

薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day6	day9	day16	day21
ブドウ糖液250mL【レジメン】	250 mL	○	○							
グラニセトロン3mg【レジメン】	1 袋	○	○	○	○	○				
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	3 A	○	○	○	○	○				
エトポシド【レジメン】	100 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○	○	○				
ブドウ糖液500mL【レジメン】	500 mL	○	○	○	○	○				
シスプラチニ【レジメン】	20 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○	○	○				
生食注500mL【レジメン】	500 mL	○	○	○	○	○				
細胞外液A c e 500mL【レジメン】	500 mL	○	○	○	○	○	○			
メトクロラミド10mg【レジメン】	1 A	○	○	○	○	○				
維持液500mL【レジメン】	500 mL	○	○	○	○	○				
ブレオマイシン【レジメン】	20 mg/m <sup>2</sup>		○					○	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL		○					○	○	
生食注50mL【レジメン】	50 mL							○	○	
休薬完了										休

レジメン名 CBDCA

薬品名	投与量	day1	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
パロノセトロン0.75mg【レジメン】	1 袋	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	2 A	○	
カルボプラチナ【レジメン】	AUC 6	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	
休薬完了		休	

レジメン名 CPT-11

薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	○	○	
パロノセトロン0.75mg【レジメン】	1 袋	○	○	○	
デキサメタゾン1.65mg【レジメン】	1 A	○	○	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	1 A	○	○	○	
イリノテカン【レジメン】	100 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	○	○	
休薬完了					休

レジメン名 DC(卵巣がん)

薬品名	投与量	day1	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
パロノセトロン0.75mg【レジメン】	1 袋	○	
デキサメタゾン1.65mg【レジメン】	1 A	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	1 A	○	
ドセタキセル【レジメン】	70 mg/m <sup>2</sup>	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	
カルボプラチナ【レジメン】	AUC 6	○	
休薬完了		休	

レジメン名 DC+ベバシズマブ(術後1ケール目)

薬品名	投与量	day1	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
パロノセトロン0.75mg【レジメン】	1 袋	○	
デキサメタゾン1.65mg【レジメン】	1 A	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	1 A	○	
ドセタキセル【レジメン】	75 mg/m <sup>2</sup>	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	
カルボプラチナ【レジメン】	AUC 5	○	
休薬完了		休	

レジメン名 DC+ベシズマブ(1～6クール目(術後2～6クール目))

薬品名	投与量	day1	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
パロノセトロン0.75mg【レジメン】	1 袋	○	
デキサメタゾン1.65mg【レジメン】	1 A	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	1 A	○	
ドセタキセル【レジメン】	75 mg/m <sup>2</sup>	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	
カルボプラチニ【レジメン】	AUC 5	○	
ベシズマブ【レジメン】	15 mg/kg	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	
休薬完了			休

レジメン名 DC+ベシズマブ(7ケール目以降)

薬品名	投与量	day1	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
ベシズマブ【レジメン】	15 mg/kg	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	
休薬完了			休

レジメン名 DTX(卵巣がん)

薬品名	投与量	day1	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	2 A	○	
ドセタキセル【レジメン】	70 mg/m <sup>2</sup>	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	
休薬完了			休

レジメン名 dose-denseTC

薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	○	○	
パロノセトロン0.75mg【レジメン】	1 袋	○			
デキサメタゾン1.65mg【レジメン】	1 A	○			
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	1 A	○			
	2 A		○	○	
ファモチジン20mg【レジメン】	1 A	○	○	○	
パクリタキセル【レジメン】	80 mg /m <sup>2</sup>	○	○	○	
ブドウ糖液250mL【レジメン】	250 mL	○	○	○	
カルボプラチニ【レジメン】	AUC 6	○			
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○			
休薬完了					休

レジメン名 DP(卵巣がん)

薬品名	投与量	day1	day21
細胞外液 A c e 500mL 【レジメン】	500 mL	○	
パロノセトロン0.75mg 【レジメン】	1 袋	○	
デキサメタゾン3.3mg 【レジメン】	3 A	○	
ドセタキセル【レジメン】	70 mg /m <sup>2</sup>	○	
生食注250mL 【レジメン】	250 mL	○	
フロセミド20mg 【レジメン】	1 A	○	
シスプラチニ【レジメン】	60 mg /m <sup>2</sup>	○	
生食注500mL 【レジメン】	500 mL	○	
維持液500mL 【レジメン】	500 mL	○	
休薬完了			休

レジメン名 GC

薬品名	投与量	day1	day8	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	○	
パロノセトロン0.75mg【レジメン】	1 袋	○		
デキサメタゾン1.65mg【レジメン】	1 A	○		
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	1 A	○		
	2 A		○	
ゲムシタビン【レジメン】	1000 mg/m <sup>2</sup>	○	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	○	
カルボプラチナ【レジメン】	AUC 4	○		
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○		
休薬完了				休

レジメン名 GC+ベバシズマブ(1~6クール目)

薬品名	投与量	day1	day8	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	○	
パロノセトロン0.75mg【レジメン】	1 袋	○		
デキサメタゾン1.65mg【レジメン】	1 A	○		
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	1 A	○		
	2 A		○	
ゲムシタビン【レジメン】	1000 mg/m <sup>2</sup>	○	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	○	
カルボプラチナ【レジメン】	AUC 4	○		
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○		
ベバシズマブ【レジメン】	15 mg/kg	○		
休薬完了				休

レジメン名 GC+ベバシズマブ(7クール目以降)

薬品名	投与量	day1	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
ベバシズマブ【レジメン】	15 mg/kg	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	
休薬完了			休

レジメン名 PLD

薬品名	投与量	day1	day28
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	2 A	○	
ブドウ糖液100mL【レジメン】	100 mL	○	
ドキソルビシン（ドキシル）【レジメン】	40 mg/m <sup>2</sup>	○	
ブドウ糖液250mL【レジメン】	250 mL	○	
休薬完了		休	

レジメン名 TC(卵巣がん)

薬品名	投与量	day1	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
パロノセトロン0.75mg【レジメン】	1 袋	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	5 A	○	
ファモチジン20mg【レジメン】	1 A	○	
パクリタキセル【レジメン】	180 mg/m <sup>2</sup>	○	
ブドウ糖液250mL【レジメン】	250 mL	○	
カルボプラチナ【レジメン】	AUC 6	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	
休薬完了			休

レジメン名 TC+ベバシズマブ(1クール目)

薬品名	投与量	day1	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
パロノセトロン0.75mg【レジメン】	1 袋	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	5 A	○	
ファモチジン20mg【レジメン】	1 A	○	
パクリタキセル【レジメン】	175 mg/m <sup>2</sup>	○	
ブドウ糖液250mL【レジメン】	250 mL	○	
カルボプラチナ【レジメン】	AUC 6	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	
休薬完了			休

レジメン名 TC+ベバシズマブ(2~6ケール目)

薬品名	投与量	day1	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
パロノセトロン0.75mg【レジメン】	1 袋	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	5 A	○	
ファモチジン20mg【レジメン】	1 A	○	
パクリタキセル【レジメン】	175 mg/m <sup>2</sup>	○	
ブドウ糖液250mL【レジメン】	250 mL	○	
カルボプラチナ【レジメン】	AUC 6	○	
生食注250mL【レジメン】	250 mL	○	
ベバシズマブ【レジメン】	15 mg/kg	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	
休薬完了			休

レジメン名 TC+ベバシズマブ(7クール目以降)

薬品名	投与量	day1	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	
ベバシズマブ【レジメン】	15 mg/kg	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	
休薬完了			休

レジメン名 ノギテカン

薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day21
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	○	○	○	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	2 A	○	○	○	○	○	
ノギテカン【レジメン】	1.25 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○	○	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	○	○	○	○	
休薬完了							休

レジメン名 PLD+Bev

薬品名	投与量	day1	day15	day28
生食注50mL【レジメン】	50 mL	○	○	
デキサメタゾン3.3mg【レジメン】	2 A	○		
ブドウ糖液100mL【レジメン】	100 mL	○		
ドキソルビシン（ドキシル）【レジメン】	40 mg/m <sup>2</sup>	○		
ブドウ糖液250mL【レジメン】	250 mL	○		
ベバシズマブ【レジメン】	10 mg/kg	○	○	
生食注100mL【レジメン】	100 mL	○	○	
休薬完了				休